



# СПОСОБЫ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ


## 1. ПРЯМОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАНУ

Рану закрыть стерильными салфетками, после чего на область раны осуществить давление рукой участника оказания первой помощи с силой, достаточной для остановки кровотечения **НЕ ПРИМЕНЯТЬ** при инородном теле в ране, открытом переломе с выступающими в рану костными отломками!




## 2. ДАВЯЩАЯ ПОВЯЗКА

На рану положить стерильные салфетки из аптечки, бинтовая повязка должна накладываться с усилием (давлением). Если повязка начинает пропитываться кровью, то поверх нее накладывают еще несколько стерильных салфеток и туго прибинтовывают



## 3. КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ



Относительно безопасный срок наложения жгута на конечность составляет 2 часа, независимо от температуры окружающей среды.

Вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 112, 103

**НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК!!!**